

مثنى القل

منتدى التعليم الثانوي الجزائري

الاستاذ : بوالريش احمد

<http://bacbac.ahlamuntada.com/index.htm>

تخصير بكالوريا 2008

<http://www.p48.75.fr/bac/forum/index.php>

المجال التعليمي 2: التحولات الطاقوية
الوحدة التعليمية 1: آليات تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية
كامنة (التركيب الضوئي)

تؤدي النباتات الخضراء وظيفة حيوية هامة تعتبر أهم ضمان لاستمرار الحياة، وإن ناتج عملية التركيب الضوئي يتمثل في تركيب جزيئات عضوية مخزنة للطاقة، حيث يقوم النبات الأخضر بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة تتم وفق تسلسل جملة من التفاعلات الكيموحيوية بآليات دقيقة ومحددة.

◀ فما هو مقرر هذه التحولات الطاقوية؟ وماهي مراحل وآليات هذه التحولات؟

النشاط 1: تذكير بالمكتسبات




(شروط عملية التركيب الضوئي ومظاهره)

التركيب ظاهرة حيوية يتم خلالها صنع جزيئات عضوية لا تتم هذه الظاهرة إلا بتوفر شروط تسمح بحدوثها.
فما هي شروط عملية التركيب الضوئي؟



* الضوء ضروري لتركيب النشا في الأوراق المعرضة للإضاءة لاحتوائها على اليخضور (أوراق خضراء)

* مظاهر التركيب الضوئي وهي انطلاق O_2 واستهلاك (امتصاص) CO_2



الخلاصة :




التركيب الضوئي، آلية تؤدي إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تخزن في شكل جزيئات عضوية، كالنشأ .

النشاط 2 : مفر عملية التركيب الضوئي : ما فوق البنية الخلوية للصناعة الخضراء

أمكن التوصل في النشاط السابق إلى أن تركيب النشا يتم في الصناعة الخضراء، حيث تحدث جميع التفاعلات الكيموحيوية للتركيب الضوئي.

كيفية تظهِر الصناعة بالمجهر الإلكتروني؟ وما تركيبها الكيميائي؟ وكيف تتوضع مكوناتها؟

1 - بنية الصانعة الخضراء



* تتم مجموع التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي داخل الصانعات الخضراء.

* للصانعة الخضراء بنية حجيرية منظمة كالتالي :
- تراكيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة: التيلاكويد.

- تجويف داخلي : الحشوة ،محددة بغشاء بلاستيدي داخلي .

- يضاعف الغشاء البلاستيدي الداخلي بغشاء خارجي

- يفصل الغشاءين البلاستيديين فراغ بين غشاءين

2 - التركيب الكيمو حيوي للصانعة الخضراء

أهم المكونات الكيميائية	جزء الصانعة الخضراء
أصبغة بخصورية أصبغة أشباه الجزرين نواقل الإلكترونات نوعان من الأنظمة الضوئية (PSII و PSD) إنزيم ATP سنتل (الكرية المذبة)	أغشية التلاكويد
مواد أفضية لتركيب الجزيت العصبية مرافقت إنزيمية (NADPH و NADP ⁺) Pi و ADP, ATP إنزيمات متنوعها أهمها ريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز Rubisco	الحشوة


• تحوي الأغشية التيلاكويدية أصبغة التركيب الضوئي (اليخضور ،أصبغة أشباه الجزرين) وجهاز أنزيمي بما في ذلك الـ ATP سينتاز

• تحوي الحشوة مواد الأيض الوسيطة لتركيب المواد العصبية كنواقل البروتونات الـ (NADPH - H⁺) ، الـ ADP و الـ ATP وكذلك عدد من الأنزيمات كالريبولوز ثنائي

الفوسفات كربوكسيلاز .

التركيب الكيميائي لمكونين للصانعة الخضراء (الحشوة وأغشية التيلاكويود) مختلفة مما يعطي إشارة أولى إلى اختلاف الدور الذي يقوم به كل منهما


3 - ما فوق بنية التيلاكويود (تموضع مكونات التيلاكويود)



الأنظمة الضوئية هي معقدات بروتينية كبيرة تحتوي على عد كبير من الصبغات موزعة بطريقة منتظمة داخل المعقد البروتيني

4 - طبيعة التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي


إن التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي يمكن تلخيصها في المعادلة الإجمالية التالية:



- أن تفاعلات ظاهرة التركيب الضوئي هي تفاعلات أكسدة وإرجاع.
- أن الأكسدة تتم في غشاء التيلاكويود لأنها تتطلب وجود اليخضور بينما يتم الإرجاع في الحشوة.
- أن اختلاف دور كل من التيلاكويود والحشوة يعود إلى اختلاف تركيبهما الكيميائي.

5 - مراحل عملية التركيب الضوئي

لتوضيح مراحل حدوث عملية التركيب الضوئي تم تعريض معلق للصانعات الخضراء للضوء في شروط تجريبية مناسبة في غياب CO_2 فلوحظ انطلاق O_2 لفترة قصيرة ثم يتوقف. عند وضع المعلق السابق في الظلام وإمداده بـ CO_2 لوحظ تثبيت CO_2 وتركيب للسكر لفترة قصيرة. عند وضع المعلق في الضوء و CO_2 يلاحظ انطلاق O_2 وتثبيت CO_2 بصورة مستمرة. مراحل التجربة موضحة في أشكال الوثيقة (3).



- وجود مرحلتين من عمليتي التركيب الضوئي لكل منهما شروطها ومقرها
- شروط حدوث المرحلتين حيث المرحلة (الكيموضوئية) تتطلب الضوء واليخضور وتؤدي إلى انطلاق O_2 من أغشية التيلاكويد.
- تتطلب المرحلة (الكيموحويوية) توفر CO_2 ولا تتطلب الضوء وتؤدي إلى امتصاص CO_2 في الحشوة

النشاط 3 : نفاعلات المرحلة الكيموضوئية

الهدف : وجود مرحلتين من عملية التركيب الضوئي وأن المرحلة الكيموضوئية تتم على مستوى

التيلاكويد ، يتم في هذا النشاط التعرف على شروط عمل التيلاكويد وآلية حدوث هذه

1 - شروط عمل التيلاكويد :

تجربة 1:

تم تحضير معلق من التيلاكويدات المعزولة في شروط تجريبية مختلفة (ضوء وظلام)، حيث أضيف للوسط الكاشف فيروسيانور البوتاسيوم $K_3Fe(CN)_6$ بتركيز (0.1 مل) ثم (0.3 مل) الذي يقوم بدور مستقبل اصطناعي للإلكترونات وذلك في فترة الإضاءة. لوحظ بعد حقن فيروسيانور البوتاسيوم تغير لون محلول الوسط من بني محمر (حالة مؤكسلة) إلى أخضر (حالة مرجعة). نتائج التجربة المدعمة بالحاسوب توضحها الوثيقة (1).


تحليل الوثيقة 1

*تؤثر كمية المستقبل على انطلاق O_2 والتي تزداد بزيادة كمية المستقبل

* أن وجود الضوء لوحده كان غير كافياً لانطلاق O_2

* حدث تفاعل إرجاع للمستقبل


(استقبال إلكترونات) الذي تحول من اللون البني المحمر إلى اللون الأخضر. لكن التفاعل في عملية التركيب الضوئي هو تفاعل أكسدة أدت إلى تحرير الإلكترونات التي قامت بإرجاع المستقبل. شروط انطلاق O_2 وهي توفر الإضاءة ومستقبل الإلكترونات.



التجربة 2 : تأثير ألوان الطيف على عمل التيلاكويد

تحليل الوثيقة


لإظهار دور ألوان الطيف على عمل التيلاكويد يتم تعريض معلق للصانعات الخضراء إلى ضوء بأطوال موجات مختلفة في المجال المرئي (من 380 إلى 700 نانومتر) ويتم قياس كمية الأكسجين المنطلق عن طريق إدخال لاقط O_2 إلى المعلق. كما يتم في تجربة موازية قياس شدة الامتصاص لمحلول اليخضور الخام في نفس مجال الضوء المستعمل. نتائج التجريبتين موضحة في منحنى الوثيقة (2).



تحليل الوثيقة 2

- الأشعاعات الطرفية للطيف هي الأكثر امتصاص من طرف اليخضور (البنفسجية والحمراء)
- الأشعاعات الزرقاء والنيلي والصفراء والبرتقالية في اقل امتصاص من طرف اليخضور.
- الأشعاعات الخضراء يمتصها اليخضور بنسبة ضئيلة جدا.
- الطيف الأكثر تأثيرا هو الأكثر امتصاصا


- هناك توافق بين طيف الامتصاص وطيف النشاط : الإشعاعات الأكثر فعالية في التركيب الضوئي هي الأكثر امتصاص من طرف اليخضور



موجات الضوء المرئي والأصباغ التي تمتصها

تجربة 3 : تأثير ال ADP و Pi على عمل التيلاكويد

تم قياس تركيز كل من O_2 و ATP في معلق من الصانعات الخضراء في شروط تجريبية مناسبة قبل وبعد حقن مادتي ADP و Pi. نتائج وشروط التجربة موضحة في الوثيقة (3).




تحليل الوثيقة 3 :

* توضح التجربة التأثير المحفز لـ ADP و Pi على شدة التركيب الضوئي التي يتم التعبير عنها عن طريق الأكسجين المنطلق و الزيادة في تركيز .
 أن لـ ADP و Pi تأثير محفز للتركيب الضوئي

د : دور CO₂ في عمل التيلاكويد

لإظهار ذلك تجري تجربة مشابهة للتجربة الموضحة في الشكل (3) من الوثيقة (2) في النشاط السابق. حيث يتم تعريض معلق من الصانعات الخضراء للضوء في غياب CO₂ فيلاحظ انطلاق O₂ لفترة قصيرة. النتائج موضحة في الوثيقة (4).



تحليل الوثيقة 4 :

* أن CO₂ غير ضروري لعمل التيلاكويد وذلك لأن انطلاق O₂ يتم في غياب CO₂ .
 أن CO₂ ليس شرطاً لعمل التيلاكويد وإنما شرط لعمل الحشوة ، بينما الضوء شرط لحدوث المرحلة أ (انطلاق O₂) وليس شرطاً لحدوث المرحلة ب (تثبيت CO₂) .

2 آلية عمل التيلاكويد :

أ – إظهار مصدر الاوكسجين المنطلق :

في شروط تجريبية مناسبة تسمح بقياس كمية (O₂) وضعت الكلوريل (أشنة خضراء) في وسطين يحوي كل منهما على 4% من CO₂ ومعرضين للضوء، الوسط الأول يحوي CO₂* (ذو أكسجين مشع) بينما يحتوي الوسط الثاني على H₂O* (ذو أكسجين مشع). النتائج موضحة في الجدول الموالي.


الأكسجين المنطلق	الجزيئة الحاملة للإشعاع	الوسط
غير مشع	CO_2^*	الأول
مشع	H_2O^*	الثاني

تحليل الوثيقة 4 :

• أن مصدر الأكسجين المنطلق هو الماء وليس CO_2

ب - مصدر الإلكترونات لارجاع المستقبل الاصطناعي (شوارد الحديد)

الوثيقة التالية تلخص التفاعلات التي أدت الى تحول لون المحلول وانطلاق الاوكسجين في التجربة الممثلة في الوثيقة 1 في المعادلة التالية :




• التفاعل 1 : أكسدة : فقد الكترونات

لتفسير أن التفاعل هو أكسدة تتم مقارنة رقم التكافؤ لشوارد الحديد التي تحولت من الصورة الثنائية Fe^{++} إلى الصورة الثلاثية Fe^3

التفاعل 2 أ ارجاع : اكتساب الكترونات

• أن مصدر الأكسجين المنطلق هو الماء بعد حدوث عملية أكسدة



ج - دور اليخضور والضوء في ارجاع مستقبل الإلكترونات



الإشكالية العلمية تتمثل في وجود تناقض بين قاعدة انتقال الإلكترونات في تفاعلات الأكسدة والإرجاع

(وهي أن الإلكترونات تنتقل من الكمونات المنخفضة نحو الكمونات المرتفعة) وما تم التوصل إليه

سابقا حول دور الماء كمصدر للإلكترونات

1) تجربة التفلور (الإستشعاع):

نعرض وعاء زجاجي مخروطي يحوي محلول يخضور خام (تم استخلاصه سابقا) لحزمة من الضوء الأبيض وذلك في غرفة مظلمة، الملاحظات المسجلة إلى جانب تفسير الظاهرة موضحة في أشكال الوثيقة (5).



تحليل الوثيقة 5 :

تجربة التفلور: تهدف التجربة التي يمكن إجراؤها في المخبر إلى تفسير ظهور اللون الأحمر عند تعريض محلول اليخضور الخام للضوء (محلول اليخضور الخام يتم الحصول عليه عن طريق سحق نسيج نباتي أخضر في وجود مذيب عضوي ثم الترشيح)

* تفسير ظهور الضوء الأحمر على أنه ضوء صادر من اليخضور بعد حدوث تهيج بسبب اكتساب

الإلكترون لطاقة والانتقال إلى مدار ذو طاقة أعلى

* أن الإلكترون يعود إلى مداره بينما تفقد الطاقة في شكل حرارة وضوء

* اكتساب الصبغات للطاقة وحدث التهيج بانتقال إلكترونات إلى مدار خارجي. لكن التفلور تم على


صبغات مستخلصة من نسيج نباتي (صبغات فقد توضعها الطبيعي).

2 - آلية عمل الأنظمة الضوئية :

ماذا يحدث في حالة الصبغات المتواجدة ضمن الأنظمة الضوئية التي لم تفقد توضعها الطبيعي (ضمن الأنسجة النباتية)


أ - تأثير الضوء على الأنظمة الضوئية :

توضح الوثيقة التالية آلية عمل أصبغة النظام الضوئي



تحليل الوثيقة :

- دور الأصبغة الهوائية في استقبال ثم نقل الطاقة الضوئية
 - الفرق الأساسي بين دور الأصبغة الهوائية وأصبغة مركز التفاعل التي تتم فيها عملية أكسدة (فقد الإلكترون) بعكس الأصبغة الهوائية التي لا تفقد الإلكترونات
 - تسمية مركز التفاعل بسبب حدوث تفاعل الأكسدة
- لتوضيح عمل الأنظمة الضوئية نستعرض المعطيات الموضحة في الوثيقة التالية
- * أصبغة مركز التفاعل التي تتأكسد عند وصول الطاقة إليها من الأصبغة الهوائية.



1 يتم تنشيط اللاقطات (كلوروفيل وصبغات مساعدة) لرفع الإلكترون لمستوى طاقة أعلى.

2 الجزيء اللاقط يمرر الطاقة لجزيء كلوروفيل مجاور مشطاً إياه فيعود الإلكترون في الجزيء الأول بعدما إلى مداره الأصلي، وتكرر العملية حتى يصل مركز التفاعل.

3 تمرر الطاقة لكلوروفيل مركز التفاعل فيرتفع الإلكترون إلى مدار أعلى في الطاقة.

4 يمرر كلوروفيل مركز التفاعل الإلكترون المنشط إلى جزيء مستقبل للإلكترون فتصبح شحنة كلوروفيل مركز التفاعل (الجزيء المانح للإلكترون) موجبة بسبب فقدته إلكترونًا للمستقبل، بينما تصبح شحنة الطرف الآخر (مستقبل الإلكترون) سالبة.


5 الإلكترون المفقود من كلوروفيل مركز التفاعل يتم تعويضه من جزيء مانح للإلكترون، فتصبح شحنة الكلوروفيل متعادلة، بينما يقوم الجزيء المانح للإلكترون بانتزاع إلكترون من الماء مما يؤدي إلى تحلله إلى أكسجين وبروتونات.



انفصال الشحنات في مركز التفاعل نتيجة امتصاص الطاقة الضوئية.


لتوضيح حالة أصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي بعد اكتسابها للطاقة نقدم الوثيقة التالية :

*** أن انتقال الطاقة بين الأصبغة الهوائية يتم بدون انتقال الإلكترون (انتقال الطاقة دون الإلكترون) بينما تنتقل الطاقة والإلكترون في مركز التفاعل



ب - مصدر الكترولونات إرجاع المستقبل الاصطناعي :

لتوضيح - مصدر الكترولونات إرجاع المستقبل الاصطناعي شوارد الحديد نستعرض المعادلات والمخططات التالية :



- مصدر الإلكترونات هو الأنظمة الضوئية وأن انتقال الإلكترونات لا يكون مباشرة من الماء إلى شوارد الحديد.
- هناك فقد لإلكترونات الماء وفقد لإلكترونات مركزي التفاعل وهناك استقبال للإلكترونات من طرف المستقبل فما هو تسلسل هذه التفاعلات؟

3 - تسلسل تفاعلات المرحلة الكيمووضوئية


يهدف هذا النشاط إلى تحديد تسلسل تفاعلات المرحلة الكيمووضوئية

أ - مصير الإلكترونات الحرة.

يهدف هذا الجزء إلى تتبع مصير الإلكترونات التي تتحرر من أصبغة مركز التفاعل بالتطرق إلى دور نواقل الإلكترونات التي تم التعرف عليها من خلال مكونات غشاء التيلاكويد (الصفحة 178).


1 - مصير الكترولونات الماء

يهدف هذا الجزء إلى توضيح ضرورة تعويض الإلكترونات المفقودة لغرض استمرار العملية وبالتالي التساؤل عن مصدر تعويض الإلكترونات المفقودة من مركز تفاعل الأنظمة الضوئية




- من خلال المعادلتين الموضحين 187 يتبين أن إلكترونات الماء تقوم بتعويض الإلكترونات المفقودة من النظام الضوئي الثاني PSII .

2 - مصير الكترولونات PSII




- من خلال المعادلتين الموضحتين فيتبين أن إلكترونات PSII تعوض الإلكترونات المفقودة من PSI


3 - مصير الكترولونات PSI



- المعادلتين فتبينان أن مصير الإلكترونات المفقودة من PSI هو المستقبل الطبيعي للإلكترونات وهو $NADP^+$.
- إن المستقبل الأخير للإلكترونات الناتجة عبارة عن ناقل للبروتونات والإلكترونات يدعى النيكوتين أميد ثنائي نكليوتيد فوسفات $NADP^+$ الذي يُرجع إلى $NADPH, H^+$ بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز حسب التفاعل العام:




ب - آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية




الموثيقة (9)

المخططات الموضحة في الوثيقة 9 توضح نفس التسلسل لتفاعلات انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية لكن بطرق مختلفة مع توضيح قيم كمن الأكسدة الإرجاعية التي توضح الآلية الفيزيائية لانتقال الإلكترونات (من الكمونات المنخفضة إلى الكمونات المرتفعة).


في الوثيقة 10 تم تحويل بعض أجزاء المخطط إلى معادلات بسيطة لتوضيح آلية الانتقال وعدد الإلكترونات المنقولة بالإضافة إلى توضيح انتقال الإلكترونات فقط أو البروتونات حسب الطبيعة الكيميائية للناقل.



الوثيقة (10)




- المعادلة 2 توضح أن الإلكترونات المفقودة من PSII يتم استقبالها من طرف الناقل T_1 الذي يقوم بنقل إلكترونين وبروتونين (ناقل لإلكترونات + بروتونات).
- تتم الإشارة إلى أن الناقل T_1 الذي ينقل الإلكترونات والبروتونات يضطر إلى أخذ بروتونات من الحشوة مما يؤدي إلى انخفاض تركيزها في الحشوة.
- في المعادلة 3 و4 يلاحظ التلميذ أن انتقال الإلكترونات بين T_1 و T_2 ، حيث أن T_2 لا ينقل البروتونات لذلك يتم تحرير البروتونات نحو الوسط الداخلي ، مما يزيد من تركيزها في الداخل.
- * المعادلة 5 هي محصلة المعادلتين 3 و 4 .
- فقد e- من النظام الضوئي يكون نتيجة التهيج لاستقباله الطاقة من الأصبغة الهوائية.
- من مخططات الوثيقة 9 يمكن استخراج قيم كمون الأكسدة الإرجاعية لكل من T_1 و T_2 والتي تقدر بـ -0.8 و 0.0 تقريبا أي أن الانتقال تم من الكمون المنخفض إلى المرتفع وأن الفرق كان *
المعادلة الموالية في السلسلة التركيبية الضوئية تكون على الشكل التالي:



ج - مصير البروتونات المتراكمة داخل التجويف

يهدف هذا الجزء إلى تحديد مصير البروتونات المتراكمة مع العلم أن تراكمها كان عكس تدرج التركيز وتطلب طاقة

- أثناء انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية تتحرر منها طاقة (يمكن ملاحظتها من خلال ارتفاع كمون الأكسدة / إرجاع) تستعمل في نقل البروتونات H^+ من الحشوة إلى داخل تجويف الكيس بواسطة الناقل T_2 الذي يقوم بدور المضخة لإدخال البروتونات من الحشوة إلى التجويف مما يؤدي إلى تكون فرق في تركيز البروتونات (نقل فعال).
- فما هو مصير هذه البروتونات التي يتم إدخالها إلى تجويف الكيس إلى جانب البروتونات الناتجة عن تحلل الماء ؟
- لتوضيح ذلك نستعرض التجربة التي أجراها الباحث ياغندورف André Jagendorf وذلك اعتمادا على النظرية الكيمواسموزية للعالم ميتشل Peter Mitchell تم في هذه التجربة وضع كيبسات معزولة في وسط ذو pH محدد ويحتوي على ADP و Pi، التركيب التجريبي ومراحل التجربة موضحة في الوثيقة (11).



الوثيقة (11)


تحليل الوثيقة 11

- بمفهوم pH وعلاقته بتركيز البروتونات (سلم pH يتناسب عكسا مع تركيز البروتونات). أي أن تركيز البروتونات يكون مرتفعا في pH المنخفض والعكس صحيح. التفسير الشاردي يرتبط بتركيز شوارد الهيدروجين H+
- تفسير التغير pH التجويف من خلال التركيز على دخول البروتونات لأنه زيادة في تركيز البروتونات.
- فائدة استعمال قاعدة NaOH التي ترفع من pH الوسط الخارجي وتسمح بإحداث فرق في pH أو فرق في تركيز البروتونات بين داخل وخارج التجويف.
- أن تركيب ATP تم بواسطة إنزيم ATP Synthase انطلاقا من ADP و Pi حيث يقوم الإنزيم بتشكيل رابطة كيميائية بين ADP و Pi باستعمال طاقة تستمد من دخول البروتونات عبر هذه الإنزيم كما توضحه نظرية ميتشل.



- * شروط تركيب ATP وهي وجود فرق في تركيز البروتونات وتوفر ATP Synthase (الكريهة المذبذبة) وكذلك توفر ADP و Pi

رسم تخطيطي وظيفي يبين آلية حدوث المرحلة الكيمووضوئية في عملية التركيب الضوئي



البيانات

غشاء التيلاكويد =13	السلسلة التركيبية الضوئية =9	ADP+Pi=5	H ₂ O=1
PSII =14	ATP Synthase=10	ATP=6	إلكترونات =2
PSI =15	غشاء داخلي =11	O ₂ =7	H ⁺ =3
نواقل الإلكترونات =16	غشاء خارجي =12	CO ₂ =8	إنزيم (جزء من PSII) =4

* نواتج المرحلة الكيموضوئية وهي ATP و NADPH, H⁺

* 14 و 15 يمثلان الأنظمة الضوئية وهي الأنظمة المسؤولة على استقبال وتحويل الطاقة الضوئية في

صورة إلكترونات غنية بالطاقة

* إنجاز الرسم التخطيطي الوظيفي يشمل كل المكتسبات التي تم الحصول عليها وهي:


أنواع البروتينات الموجودة في أغشية التيلاكويد التي تم التعرف عليها سابقا (عددتها ، مواقعها ، شكلها)

دور كل منها في المرحلة الكيموضوئية

* دور إنزيم ATP Synthase في تركيب ATP * انتقال الإلكترونات

* مصير الإلكترونات المنقولة. * حركة البروتونات عبر غشاء التيلاكويد

ويمكن الاستعانة كذلك بالمخطط التالي الذي يلخص المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي




الخلاصة :

يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه تجويف الثيلاكويد
 إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف الثيلاكويد وحشوة الصانعة الخضراء ، ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر ATP سينتاز
 تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) :إنها الفسفرة الضوئية، نواتج المرحلة الكيموضوئية وهي ATP و $NADPH, H^+$

ملاحظة هامة :

هناك مسار حلقي للإلكترونات كما هو الحال عند البكتريا الزرقاء ، انظر المخططات



تعود الإلكترونات المنشطة مرة أخرى إلى مركز التفاعل الذي انطلقت منه في النظام الضوئي الأول مروراً بسلسلة نقل الإلكترونات ،
 منتجة طاقة على شكل ATP فقط تلزم في التفاعلات الكيموضوئية والتي تستهلك كمية كبيرة من ATP . دون إنتاج $NADPH, H^+$

النشاط 4 : تفاعلات المرحلة الكيموحيوية

يهدف هذا النشاط إلى آلية تركيب الجزيئات العضوية (السكريات) من خلال تثبيت جزيئات CO_2 . كما يهدف إلى ربط العلاقة بين المرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية وإظهار التكامل بينهما.



تحدث المرحلة الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي في الحشوة وتسمح بتثبيت CO_2 لغرض إنتاج الجزيئات العضوية : السكريات

1 - تثبيت غاز CO_2

يهدف هذا النشاط الجزئي إلى وصف التجربة المشهورة التي قام بها العالم كالفن واستعمل فيها العناصر المشعة وتقنيات مختلفة أخرى (الفصل الكروماتوغرافي ثنائي البعد). سمحت هذه التجربة للعالم كالفن من اكتشاف سلسلة التفاعلات المؤدية إلى تثبيت CO_2 وتركيب السكر في حلقة تسمى باسمه : حلقة كالفن.

قصد التعرف على مهيير غاز CO_2 المستهلك أجزت التجربة الموضحة في التركيب التجريبي (الوثيقة 1)، حيث قام كالفن ومساعدوه بوضع معلق أشنة خضراء (الكلوريل) في وعاء شفاف معرض للضوء يسمح للأشنة بالقيام بعملية التركيب الضوئي ومزود بـ $^{14}CO_2$ مشع وذلك تحت شروط ثابتة من الحرارة والضوء.

باستعمال مضخة يتم ضخ كميات من المعلق عبر أنبوب لحو وعاء ثاني به ميثانول مغلي. يمكن التحكم في مدة تعريض الأشنة لغاز $^{14}CO_2$ المشع في فترات تمتد من ثانية واحدة إلى عدة دقائق.




رسم تخطيطي مبسط للتركيب التجريبي المستعمل في التجربة

صورة للتركيب التجريبي المستعمل في التجربة

الوثيقة (1)

باستعمال تقنية خاصة تجمع بين التسجيل ذو البعدين والتصوير الإشعاعي الذاتي يتم التعرف على محتوى مستخلص الأشنة الذي يوضح تثبيت $^{14}\text{CO}_2$ المشع ودججه في مركبات عضوية وسطوية مختلفة ممثلة في تقنية التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) ذو البعدين الذي نتاجه موضحة في الوثيقتين (3) و(2).




تحليل الوثيقتين 1 و 2 :

- أهمية التقنيات المستعملة: فاستعمال CO_2 المشع يسمح بتتبع نواتج تثبيته والمركبات الناتجة من ذلك كما يسمح استعمال الميثانول المغلي إلى توقيف التفاعلات واستخلاص المكونات وذلك بقتل الأشنة بعد فترات زمنية محددة. أما استعمال تقنية التسجيل الكروماتوغرافي ذو البعدين فيسمح بفصل المكونات والتعرف عليها.
- APG كأول مركب يظهر فيه الإشعاع وهو بذلك أول مركب يتم تصنيعه في الدورة.
- نتائج الفصل الكروماتوغرافي :
 - زمن ظهور البقع المشعة يشير إلى ترتيب تشكلها
 - كمية الإشعاع فيها يدل على تحولها مع الزمن إلى مركبات أخرى.
 - مقر حدوث تفاعلات المرحلة الكيموحيوية وهي الحشوة


• استخلاص شروط دمج CO_2 وهي حدوث المرحلة الكيموضوئية وتوفير CO_2

2 - آلية دمج (إرجاع) غاز CO_2

يهدف هذا النشاط إلى تحديد تسلسل تفاعلات المرحلة الكيموضوئية (دمج CO_2) من خلال قياس تركيز المركبات المختلفة التي يظهر فيها الإشعاع في ظروف مختلفة من الضوء والظلام.



الشكل (1)



الشكل (2)

الوثيقة (3)

قصد التعرف على تسلسل تفاعلات دمج CO_2 على مستوى الحشوة، تم إجراء تحليل مقارنة للمركبات التي يظهر فيها الإشعاع والتي تعبر عن دمج CO_2 ، مثل (APG, RuDP) والسكريات السداسية) وذلك في شروط تجريبية معينة.

(1) تم في تجربة وضع معلق لأشنة خضراء أحادية الخلية في الضوء وتم تزويده بـ $^{14}CO_2$ مشع بتركيز 1%. بعد فترة زمنية (10 دقائق) يحوّل المعلق إلى وسط خالي من CO_2 . ثم تقاس شدة الإشعاع في مركبين عضويين هما:

- RuDP (Rubilose Di Phosphate) ريبيلوز ثنائي الفسفات: مركب خماسي الكربون يقوم بتثبيت CO_2 .

- APG (Acide Phospho Glycerique) حمض فسفو غلسريك: وهو أول مركب ناتج من تثبيت CO_2 .

نتائج التجربة موضحة في منحني الشكل (1) من الوثيقة (3).

(2) في تجربة ثانية تم تزويد معلق لأشنة خضراء أحادية الخلية بـ $^{14}CO_2$ مشع (مع الحفاظ على تركيزه في الوسط ثابتاً خلال مدة التجربة)، يعرض المعلق للضوء لمدة 30 دقيقة ثم يوضع في الظلام. تقاس بعد ذلك شدة الإشعاع في كل RuDP و APG وفي السكريات السداسية (الهكسوزات). نتائج التجربة موضحة في منحنيات الشكل (2) من الوثيقة (3).

تحليل الوثيقة 3 :

• في وجود تركيز ثابت من CO_2 يكون تركيزهما ثابت مما يشير إلى تجديد كل منهما باستمرار (تحول وإنتاج بنفس الكمية).

في غياب CO_2 يرتفع تركيز RuDP مما يشير إلى أنه يتراكم لكنه لا يستهلك بينما لا يتم تركيب APG في غياب CO_2 .

• تفسير الثبات يدل على تركيب وتحول بنفس الكمية.

* أما التزايد فقط فيشير إلى حدوث تركيب دون حدوث تحول التناقص يشير إلى حدوث التحول وعدم حدوث التركيب

* الشكل 2 : يطرح حالة مختلفة حيث يتم إظهار تأثير الإضاءة على تركيز المركبين السابقين (RuDP و APG) بالإضافة إلى الهكسوزات التي تبين من خلال نتائج التسجيل الكروماتوغرافي في الصفحة 193 أنها تظهر متأخرة ويزداد تركيزها باستمرار.

في الضوء تتم عملية التركيب الضوئي ويتم طبيعياً تشكل وتحول APG و RuDP باستمرار مما يؤدي إلى ثبات تركيزهما.

في الظلام يتم تشكل APG باستمرار ولا يتم تحويله بينما يتم تحول RuDP ولا يتم تجديده مما يؤدي إلى انخفاض تركيزه

• من خلال الشكلين 1 و 2 يستخلص أن المركبين يتحولان إلى بعضهما ضمن حلقة يتطلب استمرارها توفر CO_2 و الضوء

• أن تجديد شروط RuDP يتطلب توفر CO_2 وتوفر الإضاءة .

الخلاصة :

• يثبت الـ CO_2 على جزيئة خماسية الكربون : الريبولوز ثنائي الفوسفات (Rudip) مشكلاً مركب سداسي الكربون الذي ينشط سريعاً إلى جزيئتين بثلاث ذرات كربون هو حمض الفوسفو غيليسريك (APG).

• يراقب دمج الـ CO_2 بأنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز.

* ينشط حمض الفوسفوغيليسريك المؤكسد ثم يُرجع بواسطة الـ ATP و $NADPH, H^+$


الناجين عن المرحلة الكيميوضوئية.

* يستخدم جزء من السكريات الثلاثية المرجعة في تجديد الـ Rudip أثناء خلال تفاعلات حلقة كالفن

وبنسون

* يستخدم الجزء الآخر من السكريات المرجعة في تركيب السكريات سداسية الكربون ، الأحماض الأمينية ، والدهن .

3 - مراحل حلقة كالفن :



ملاحظة هامة من المخطط :

RuBp=RuDp

إنزيم روبيسكو **Rubisco** هو اختصار لإنزيم أنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز


RIBULOSE DIPHOSPHATE CARBOXYLASE

- تركيب سكر سداسي انطلاقا من 6 جزيئات CO_2
- عدد ATP اللازمة لتركيب سكر سداسي واحد وهي 18 جزيئة.

4 – التكامل بين المرحلة الكيموضوئية والكيموحيوية

يهدف هذا النشاط إلى ربط العلاقة بين مرحلتى التركيب الضوئي (الكيموضوئية والكيموحيوية) من خلال إظهار التكامل بينهما. تم توضيح هذه العلاقة من خلال مخطط يقوم التلميذ من خلاله بإضافة البيانات اللازمة والإجابة على الأسئلة المرافقة.

تمثل الوثيقة التالية رسم تخطيطي يوضح التكامل بين المرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي




CO ₂ = 13	الحشوة = 7	1 = ضوء
سكر = 14	ADP = 8	2 = غشاء التيلاكويد
المرحلة الكيموضوئية = 15	Pi = 9	3 = نظام ضوئي
المرحلة الكيموحيوية = 16	ATP = 10	4 = H ₂ O
17 = مخطط يوضح التكامل بين مرحلتى التركيب الضوئي	NADP ⁺ = 11	5 = تيلاكويد (كبيس)
	NADPH, H ⁺ = 12	6 = أكسجين

تحليل الوثيقة :



- أن دور الإضاءة هو حدوث المرحلة الضوئية التي توفر ATP و NADPH,H^+ . لذلك فإن توفيرهما في الظلام يؤدي إلى تثبيت CO_2 دون الحاجة إلى الإضاءة.
- لـ CO_2 دور غير مباشر في انطلاق O_2 حيث يؤثر بطريقة رجعية Feed-back. أي أن تثبيت CO_2 يسمح بتجديد مركبات ADP و Pi و NADP^+ الضرورية لاستمرار المرحلة الكيموضوئية التي تؤدي إلى انطلاق O_2 .
- في هذه التجربة الموضحة في الوثيقة 4 لوحظ انطلاق O_2 لفترة قصيرة فقط في غياب CO_2 وقد يعود ذلك إلى توفر كمية من ADP و Pi و NADP^+ استعملت في المرحلة الكيموضوئية ولكنها لم تتجدد بسبب عدم حدوث المرحلة الكيموضوية نظرا لغياب CO_2

الخلاصة :


- أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين:
 - * تفاعلات كيموضوئية يكون مقرها التيلاكويد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.
 - * تفاعلات كيموضوية يكون مقرها الحشوة أين يتم إرجاع ال CO_2 إلى كربون عضوي بإيعمال الطاقة الكيميائية (ATP و NADPH,H^+) الناتجة من المرحلة السابقة.



ملحق للصور الأجنبية




Cyclic Electron Flow



Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Benjamin Cummings. All rights reserved.

Light Reactions & Chemiosmosis: Thylakoid Membrane



Photosynthesis: Review

