

المجال التعليمي رقم (01): التخصص الوظيفي للبروتينات

تركيب البروتين

الوحدة التعليمية الأولى

مراحل الترجمة

النشاط 5:

1- مقر تركيب البروتين في الهيولى: (لاحظ الوثيقة (1) ص 24) :

العضيات المتدخلة في تركيب البروتين على مستوى الهيولى هي : متعدد الريبوزوم (البوليزوم)
تعريف البوليزوم : هو ارتباط عدد من الريبوزومات لجزء واحد من ال-ARNm حيث يقوم كل ريبوزوم
بإنتاج سلسلة بيبتيديية في آن واحد .

العلاقة بين متعدد الريبوزوم و كمية البروتين المصنعة:

إن متعدد الريبوزوم هو طريقة فعّالة في تركيب البروتين بسرعة لإنتاج كمية معتبرة من نفس البروتين في وقت أقل ويمكن اعتبار عدد الريبوزومات المرتبطة هو وسيلة للتحكم في سرعة و كمية البروتين حسب حاجة الخلية .

ومنه فربط الأحماض الأمينية في متتالية محددة على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متميزة تدعى **متعدد الريبوزوم** حيث تسمح القراءة المتزامنة لل-ARNm من طرف عدد من الريبوزومات بزيادة كمية البروتين المصنعة .

2- إثبات دور متعدد الريبوزوم :

نتائج تجريبية: تم دراسة كمية البروتين المصنعة في مستخلص خلوي يحتوي على كافة مستلزمات الترجمة في وجود متعدد الريبوزوم ، حيث تم إضافة إنزيم **ريبونوكلياز** (إنزيم خاص يفكك ال-ARNm) فأظهرت نتائج التجربة اختفاء متعدد الريبوزوم و عدم تشكل البروتين .

نتيجة: تشكل متعدد الريبوزوم ضروري لتركيب البروتين

3- أنماط ال-ARN الهيولية : (لاحظ الوثيقة (2) ص 25) :

تبين الوثيقة نتائج فصل ال-ARN الهيولية بطريقة الطرد المركزي

تحتوي الوثيقة على أنابيب الطرد المركزي و البقع التي تم الحصول عليها حسب وزنها (كثافتها) بالإضافة إلى المنحنيات التي توضح كمية ال-ARN في شوكة و تمت القياسات أثناء و خارج أوقات تركيب البروتين .

❖ التحليل المقارن للتسجيلين (أ) و (ب):

يظهر في التسجيل (أ) أثناء فترة تركيب البروتين القمم (1) و (2) و (3) و (4) و (5) ، أما التسجيل (ب) فيظهر فيه الدورات (1) و (2) و (3) و (4) من مقارنة التسجيلين نلاحظ غياب القمة (5) في التسجيل (ب) ، وهذا يعني أنه لا يوجد نوع من ال-ARN الممثل بالقمة (5) أي أنه تشكل فقط في فترة تصنيع البروتين .

نتيجة:

نستنتج أن الذروة (5) تبين ظهور نوع من الـ ARN أثناء تصنيع البروتين و اختفائه خارج فترة تركيب البروتين .

تحليل الوثيقة (3) ص 25 :

يُمثل الجدول الموضح في الوثيقة جدول تم فيه عرض معطيات عامة غير مرتبطة بشروط التجربة الموضحة في الوثيقة (2) حيث أن معطيات الجدول تؤكد و توضح نتائج التجربة .

❖ تحديد نوع الـ ARN في كل ذروة :

- ❖ الذروة (1) و (2) و (3) تمثل الـ ARNr (الـ ARNr الريبوزومي) .
 - ❖ الذروة (4) تمثل الـ ARNt (الـ ARNt الناقل) .
 - بالرغم من تواجد أنواع كثيرة من الـ ARNt فإن هذه الأنواع لها نفس الوزن الجزيئي تقريباً و هي تختلف في تتابع النيوكليوتيدات و ليس في الوزن مما يؤدي إلى ظهورها في نفس الذروة .
 - ❖ الذروة (5) تمثل الـ ARNm لاختفائها خارج أوقات تركيب البروتين .
- يكون عدد النيوكليوتيدات في الـ ARNm مختلف لتغير طوله بتغير المورثة (عدد الأحماض الأمينية في البروتين التي تم استنساخها) .

ملاحظة: الـ ARNt و الـ ARNr يتواجدان بصورة دائمة ، فهي تدخل في تركيب أي بروتين ، أما الـ ARNm فيظهر فقط أثناء فترة تركيب البروتين فهو يحمل معلومة وراثية لبروتين معين و يتفكك بعد الانتهاء من تركيب البروتين .


4- بنية و مكونات الريبوزوم : (لاحظ الوثيقة (3) و (4) ص 26) :

- **الطبيعة الكيميائية للريبوزوم :** يتكون الريبوزوم من بروتينات و أحماض نووية من نوع الـ ARNr
- **وصف بنية الريبوزوم :** الريبوزومات هي مقر تركيب البروتين و هي عضيات متكونة من تجمع بروتينات و حمض نووي ريبوزومي (ARNr) و تتشكل من تحت وحدتين .
- ❖ تحت وحدة صغيرة تحمل وحدة قراءة الـ ARNm
- ❖ تحت وحدة كبيرة تحمل موقعين تحفيزيين :
- الموقع (P) موقع بيبتيدي يسمح باتصال الحمض الأميني بالسلسلة البيبتيدية النامية
- الموقع (A) موقع الحمض الأميني و هو الذي يستقبل الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الجديد (اللاحق في الترتيب) .

- يتعرف الـ ARNt على الرامزة الموافقة على الـ ARNm عن طريق ثلاث نيوكليوتيدات تشكل الرامزة المضادة و المكمل لها .

5- بنية الـ ARNt :

- الأجزاء الرئيسية في بنية الـ ARNt هي :
- ❖ مكان تثبيت الحمض الأميني
- ❖ موقع الرامزة المضادة .




6- تنشيط الأحماض الأمينية : (لاحظ الوثيقة (7) و (8) ص 28) :

العناصر اللازمة لتنشيط الأحماض الأمينية الضرورية (الأمينية) هي طاقة في شكل ATP و إنزيم نوعي

❖ دراسة نتائج اصطناع البروتين في حمض زجاجي :

تجربة : نستعمل مستخلص لخلايا كبدية تم الحصول عليه بواسطة السحق في وسط يصلح للمحافظة على سلامة و بنية العضيات الخلوية و وظيفتها .

يخضع المستخلص السابق لعملية الطرد المركزي و بسرعات متزايدة تسمح العملية بالفصل التدريجي لمختلف المكونات حسب الثقل و الشكل التالي يمثل نتائج الفصل:



الوثيقة (1)

نتائج فصل المعلق الخلوي بالطرد المركزي

لإثبات قدرة مختلف العضيات على تركيب البروتين توضع كل عضية على حدة في وسط زجاجي يضاف إليه أحماض أمينية مشعة و مركب غني بالطاقة و إنزيمات متخصصة ، و بعد عملية حضانة لمدة كافية تقدر كمية الإشعاع للبروتينات المصنعة في مختلف الأوساط .

محتوى كل أنبوب و نتائجه ممثلة في الجدول التالي :

إشعاع البروتينات و كميتها (وحدة دولية)	العضيات
10,8	مستخلص كلوي كامل
1,3	ميتوكوندري
1,1	ميكروومات (ريبوزومات + أغشية خلوية)
0,4	المحلل الطافي النهائي
10,2	ميتوكوندري + مكروومات
1,5	ميتوكوندري + المحلول الطافي
1,2	ميتوكوندري + مكروومات بعد غليها

مناقشة النتائج التجريبية:

تسمح نتائج هذه التجربة بتحديد شروط و مقر تركيب البروتين حيث يتم تركيب البروتين في الريبوزومات في وجود مستخلص خلوي يحتوي على إنزيمات أنواع الـ ARN و أنواع الحموض الأمينية و في وجود الطاقة .

7- مراحل حدوث الترجمة: (لاحظ الوثيقة (9) ص 29 :

توضح الوثيقة مراحل و آلية حدوث الترجمة التي تتم في ثلاث مراحل و هي : الانطلاق ، الاستطالة ، النهاية العناصر الضرورية لانطلاق الترجمة هي : تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم ، الـ ARNt الخاص بالميتيونين ، و تحت الوحدة الكبرى .

❖ الظواهر التي تحدث في نهاية الترجمة هي :

- انفصال السلسلة البيبتيدية المتشكلة .
- انفصال الـ ARNt الأخير .
- انفصال الـ ARNm ثم تفككه .
- انفصال تحت وحدتي الريبوزوم .
- انفصال الميتيونين عن بداية السلسلة البيبتيدية .

❖ تتم عملية الترجمة في ثلاث مراحل هي :

أ) مرحلة الانطلاق (البداية) :

- يثبت الـ ARNm على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم .
- تثبت الرامزة الأولى للـ ARNm (AUG) و تدعى الرامزة **البادئة** للتركيب على مضاد الرامزة الموجودة على الـ ARNt الأول .
- يتم تعرف الـ ARNt على الرامزة الثلاثية الموجودة على الـ ARNm عن طريق الرامزة المضادة .
- يتم ارتباط تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم و بذلك يتشكل **معقد الانطلاق** .

ب) مرحلة الاستطالة :

- يتم توضع الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A للريبوزوم وفق الرامزة الثانية على جزيء الـ ARNm
- يتم تكوين الرابطة البيبتيدية بين الحمض الأميني الأول و الثاني بتدخل إنزيمات خاصة و طاقة .
- يفصل الحمض الأميني الأول عن الـ ARNt الذي يفصل بدوره عن الموقع P للريبوزوم .
- يسمح تقدم الريبوزوم ثلاث نيوكليوتيدات بانتقال الـ ARNt الثاني من الموقع A إلى الموقع P ليحل محله ARNt جديد حامل لحمض أميني ثالث و الذي يملك رامزة مقابلة للرامزة الثالثة للـ ARNm ثم تتشكل رابطة بيبتيدية بين الحمض الأميني الثالث و ثنائي البيبتيد السابق .

ج) مرحلة النهاية : تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف و

هي (UAA) ، (UAG) ، (UGA) .

- يفصل الـ ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد البيبتيد المتشكل حرًا .
- تنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضهما البعض .
- انفصال الـ ARNm .
- يتحرر البروتين المتشكل و يفصل الميتيونين عن أول السلسلة البيبتيدية .

8- مصير البروتين المتشكل : (لاحظ الوثيقة (10) ص 31) :

تمثل الوثيقة المسار الذي يسلكه البروتين من مكان التركيب (الريبوزومات) إلى مكان النضج (جهاز غولجي) ، ثم طرح البروتين خارج الخلية عن طريق الحويصلات الإفرازية في حالة البروتينات الإفرازية .

أي أن البروتين بعد تركيبه ينضج و يوجه إلى المقر الذي يؤدي فيه وظيفته داخل أو خارج الخلية .

- يمثل المنحنى البياني في الوثيقة (11) النشاط الإشعاعي في عضيات الخلية في البداية يكون النشاط الإشعاعي مرتفع في الشبكة الهيولية الفعالة و منخفض في جهاز غولجي و الحويصلات الإفرازية .
- خلال التجربة ينخفض الإشعاع في الشبكة الهيولية و يزداد في جهاز غولجي و يرتفع في الحويصلات الإفرازية .
- في نهاية التجربة يصبح الإشعاع منخفض جداً في الشبكة الهيولية الفعالة و جهاز غولجي في حين يبلغ قيمته القصوى في الحويصلات الإفرازية .
- الغرض من تواجد البروتين في كل عضوية :
- الريبوزوم : مقر تركيب البروتين .
 - جهاز غولجي: مقر اكتمال و نضج البروتين .
 - الحويصلات الإفرازية : هي وسيلة نقل البروتين إلى خارج الخلية عن طريق الإطراح الخلوي .
- 9- مقارنة التعبير المورثي عند حقيقيات و بدائيات النوى : (لاحظ الوثيقة ص 35) :

بدائيات النوى	حقيقيات النوى
- لا يوجد غلاف نووي ، لدى توجد المورثات في السيتوبلازم .	- يوجد غلاف نووي يعزل المورثات المحمولة على الصبغيات في النواة .
- تبدأ الترجمة قبل انتهاء النسخ و تحدث الأليتين في نفس الوقت و الموقع لذلك سرعة التركيب الحيوي كبيرة .	- يتم الاستنساخ في النواة و بعدها تتم الترجمة في الهيولى لذلك يستغرق وقت طويل .
- النسخ و الترجمة متزامنتان .	- النسخ و الترجمة غير متزامنتان .
- الـ ARNm و الـ ADN بنفس الطول .	- الـ ARNm النهائي الذي يترجم أقص من الـ ADN .
- كل المورثات موجودة على نفس الصبغي .	- المورثات موزعة على عدة صبغيات .
- النسخ و الترجمة كلياً .	- المادة الوراثية تستنسخ كلياً و لا تترجم كلياً .

الخلاصة

- الترجمة : هي تحويل اللغة النووية إلى لغة بروتينية و يتم خلالها ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها الـ ARNm إلى متتالية من الأحماض الأمينية في الهيولى .
- يتم ربط الأحماض الأمينية في متتالية محددة على مستوى الريبوزومات .
- تتطلب الترجمة العناصر التالية:
ريبوزومات ، ARNm ، ARNt ، الطاقة (ATP) ، إنزيمات خاصة ، الأحماض الأمينية .
- تتضمن الترجمة ثلاث مراحل :
الانطلاق ، الاستطالة ، النهاية .
- تركيب البروتين عند بدائيات النوى يتم في مرحلتين تحدثان في نفس المكان و في آن واحد ، أي تنطلق الترجمة قبل الاستنساخ .
- أما عند حقيقيات النوى فأليتي النسخ و الترجمة منفصلتان تماماً في الزمان و المكان و هذا راجع لوجود نواة معزولة عن الهيولى .
- النسخ و الترجمة آليتان منظمتان حسب حاجيات العضوية و التي تشرف عليها إنزيمات متخصصة (نوعية) .
- البروتين المركب ينقل على جهاز غولجي لاكتمال نضجه ثم إلى الحويصلات الإفرازية في حالة الخلية الإفرازية ، أو يوجه إلى المقر الذي يؤدي فيه وظيفته داخل أو خارج الخلية .

تمرين :


- 1- تمثل الوثيقة (1) تتالي النيوكليوتيدات في الـ ARNm المسؤول عن تركيب الأحماض الأمينية الأخيرة لجزيء الأنسولين
 أ) باستعمال جدول الشفرة الوراثية حدد تركيب السلسلة البيبتيدية للأحماض الأمينية الأخيرة و الموافقة لقطعة الـ ARNm .
 ب) مثل جزء من المورثة المسؤول عن تركيب سلسلة الأحماض الأمينية الأخيرة .

GGU GGC UUC UUC UAC ACU CCU AAG ACU

الوثيقة (1)

2-

- بتقنية خاصة تعتمد على استعمال الأحماض الأمينية المشعة نتبع تركيب البروتين على مستوى بوليزوم و على مستوى الريبوزوم الحر
 النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (2) :



الوثيقة (2)

- أ. ما هي المعلومات التي تقدمها الوثيقة (2) فيما يخص تركيب البروتين؟
 ب. حدد المراحل الأساسية في تركيب البروتين ، و ما هي العناصر التي تتدخل في ذلك؟
 ج. إن عملية تركيب البروتين تتطلب تدفق المعلومة و المادة و الطاقة . وضح ذلك .

الحل:

- 1- أ) متعدد البيبتيد (البروتين) :



ب) سلسلة الـ ADN :

GGT GGC TTC TTC TAC A CTC C TAA GACT
 CCA CCG AAG AAG ATG TGA GGA TTC TGA

2- أ) المعلومة التي تقدمها الوثيقة (2) فيما يخص تركيب البروتين هي :

ب) المراحل الأساسية في تركيب البروتين هي :
الاستنساخ و الترجمة

العناصر التي تتدخل في تركيب البروتين في مرحلة الاستنساخ هي :
الـ ARNm ، ريبوزومات ، إنزيمات نوعية ، طاقة (ATP) ، ARNt .
ت) إن عمليتي الترجمة و الاستنساخ عمليات حيوية يتم فيها استعمال المادة (نيوكليوتيدات و
أحماض أمينية) في تركيب مركبات جديدة تتمثل في حمض نووي ريبوي جديد و بروتينات
نوعية ، ويتطلب هذا النشاط تدفق للطاقة على شكل ATP تنتجها الميتوكوندري وتستعمل في
تنشيط و نقل الأحماض الأمينية و كل النشاطات الإنزيمية المتدخلة في التركيب .

عن موقع www.eddirasa.com

البريد الإلكتروني: info@eddirasa.com